


# INIEZIONE INTRACAVERNOSA

## Istruzioni

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (FIG. 1-2)

1. Siringa con solvente
2. Flaconcino contenente il farmaco
3. Ago grande per la preparazione della soluzione
4. Ago piccolo per iniezione
5. Salviette per disinfezione della cute



### PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

1. Rimuovere il tappo bianco dalla siringa e inserire l'ago grande
2. Rimuovere il tappo rosso del flaconcino e iniettare il solvente
3. Senza rimuovere l'ago dal tappo in gomma agitare bene il flaconcino
4. Aspirare nella siringa la quantità di soluzione necessaria
5. Rimuovere l'ago grande e inserire l'ago piccolo per l'iniezione.

### ESECUZIONE DELL'INIEZIONE INTRACAVERNOSA

1. La sede di iniezione è rappresentata dalla superficie laterale del pene (destra o sinistra è indifferente). L'iniezione **NON va eseguita** sul glande né sulla superficie dorsale (sopra) e ventrale (sotto) del pene. **FIG.3**
2. Disinfettare con la salvietta il lato prescelto per l'iniezione.
3. Inserire **TUTTO** l'ago all'interno del pene (un movimento deciso consentirà di non avvertire alcun fastidio).
4. Iniettare il farmaco. **FIG. 4**

